


Guía de **Tomate** para **México**



syngenta.

TM


Tipo bola indeterminado



Para todo México


Tomate indeterminado para el segmento tanto de invernaderos pasivos como para campo abierto, fruta de alta calidad y gran firmeza.

- Alto porcentaje de fruta extra grande
- Rendimientos altos durante toda la temporada de crecimiento para lograr una mayor ganancia
- Especialmente bien adaptado para áreas de producción con incidencia de F3
- Excelente paquete de enfermedades que protege su inversión
- RA: Ff: 1-5 / Fol: 1, 2, 3 / ToMV: 0-2 / V / TMV 0 / TSWV: T0 Ri: M / TYLCV



Para todo México-Áreas sin incidencia de F3

- Fruta extra firme, incrementando al máximo su valor para exportación
- Excelente calidad y alto rendimiento
- Forma de globo profundo
- RA: Ff: 0 / Fol: 1, 2 / ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / TSWV: T0 Ri: TYLCV



Para todo México áreas sin incidencia de F3

- Fruta extra firme, maximizando su valor para exportación
- Suprema calidad, alto rendimiento
- Forma de globo aplanado
- RA: Ff: 0-5 / Fol: 1, 2 / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV: T0 Ri: TYLCV / M



Norte de México

- Máxima ganancia por hectárea. Menores costos de producción al reducir los injertos
- Frutos de alta calidad que satisfacen las necesidades del productor y del mercado
- Mayor porcentaje de frutos comercializables
- RA: Ff: 0-5 / Fol: 0-2 (US1-3) / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV Ri: M / TYLCV

Tipo saladette indeterminado



Sahel



Vengador

Norte y Centro de México

Un favorito en el Norte-Centro de México, este tomate Saladette indeterminado produce fruta de calidad durante toda la temporada aún en condiciones adversas.

- Rendimientos muy altos que provee al productor ganancia máxima
- Hombros suaves que proveen una apariencia atractiva
- Buen comportamiento especialmente en Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Nuevo León
- Excelente paquete de enfermedades que protege su inversión
- RA: Fol: 1, 2 / For / S / Ss / ToMV: 0-2 / V Ri: M

Noreste, Bajío, Occidente, Centro y Sureste


- Excelente paquete de enfermedades
- Planta vigorosa que ofrece altos rendimientos
- Fruta firme de color rojo intenso, hombros suaves y tamaño grande
- RA: Fol: 1, 2, 3 / S / V / M Ri: TYLCV



Imad

Sinaloa

- Planta vigorosa con alta calidad de fruta y alta tendencia a tamaños XL y L.
- Su paquete de resistencias a Fusarium (F3) y Nematodos (M) disminuye significativamente el riesgo de enfermedades de la raíz, en este rubro supera el desempeño de sus competidores en el norte de México.
- RA: F3, M, ToMV, V Ri: Lt



Datos técnicos: Tomate



| Variedad | Período a madurez | Sistema de producción | Tipo de fruto | Tamaño del fruto | Características del fruto | Resistencia a enfermedades |
|-----------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|--|---|
| Tipo bola | | | | | | |
| Panzer | Intermedia | Invernadero / malla sombra y campo abierto | Bola | Grande – Extra grande | Color rojo oscuro, buena firmeza y hombros lisos | RA: Ff: 1-5 / Fol: 1, 2, 3 / ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / TSWV: TO RI: M / TYLCV |
| Pilavy | Intermedia | Invernadero / malla sombra y campo abierto | Bola | Grande | Globo aplanado, extra firme, rojo oscuro y buen cierre apical | RA: Ff: 0 / Fol: 1, 2 / ToMV: 0-2 / V / TMV: 0 / TSWV: TO RI: TYLCW |
| Torry | Intermedia | Invernadero / malla sombra y campo abierto | Bola | Grande | Muy buena firmeza, rojo oscuro, hombros lisos y buen cierre apical | RA: Ff: 0-5 / Fol: 1, 2 / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV: TO RI: M / TYLCV |
| Piranha | Intermedia | Invernadero y malla sombra | Globo aplanado | Extra grande | Color rojo intenso en forma de globo aplanado con frutos de peso promedio de 250 gramos | RA: Ff: 0-5 / Fol: 0-2 (US1-3) / V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV RI: M / TYLCV |
| Tipo saladette | | | | | | |
| Sahel | Intermedia | Invernadero / malla sombra y campo abierto | Ovalado | Grande – Extra grande | Fruta de excelente calidad, firme y brillante, mantiene su tamaño hasta el final de la cosecha | RA: Fol: 1, 2 / For / S / Ss / ToMV: 0-2 / V RI: M |
| Vengador | Intermedia | Invernadero / malla sombra y campo abierto | Ovalado | Mediano – Grande | Excelente firmeza y color | RA: Fol: 1, 2, 3 / S / V / M RI: TYLCV |
| Imad | Intermedia | Invernadero y malla sombra | Ovalado | Grande – Extra grande | Fruta de excelente calidad, mantiene su uniformidad hasta el final del cultivo | RA: F3, M, ToMV, V RI: Lt |

Abreviaturas de las enfermedades

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| Ff | Cladosporium causado por <i>Fulvia fulva</i> (ex <i>Cladosporium fulvum</i>) | TMV | Mosaico del tabaco causado por <i>Tobacco mosaic virus</i> |
| Fol | Marchitez causada por <i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> | ToMV | Mosaico del tomate causado por <i>Tomato mosaic virus</i> |
| For | Pudrición de la raíz y la corona causada por <i>Fusarium oxysporum f.sp. radialis-lycopersici</i> | TSWV | Bronceado del tomate causado <i>Tomato spotted wilt virus</i> |
| M | Anudamiento de la raíz causado por <i>Meloidogyne arenaria</i> , <i>M. incognita</i> y <i>M. javanica</i> | TYLCV | Virus del enchinamiento amarillo del tomate causado por <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> |
| Pst | Peca bacteriana (mancha negra) causada por <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i> | V | Marchitez causada por <i>Verticillium albo-atrum</i> , <i>V. Dahliae</i> |
| Ss | Mancha gris de la hoja causada por <i>Stemphylium solani</i> | RA | Resistencia alta |
| Lt | Cenicilla polvorienta causada por <i>Leveillula taurica</i> | RI | Resistencia intermedia |

Las razas del patógeno están indicadas a la derecha de la abreviación en paréntesis [ejemplo: Fol (1,2) = Marchitez por fusariosis (*fusarium*) causada por las razas 1 y 2 del *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici*]. En casos donde razas o especies específicas no son mencionadas, la variedad es resistente a algunas, pero no necesariamente a todas las razas o especies conocidas del patógeno. Para información completa sobre resistencia a enfermedades, por favor visite www.syngenta.com.mx